

ДЕЯТЕКС

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Деятекс.

Международное непатентованное название: Кетопрофен.

Лекарственная форма: гель для наружного применения.

Состав:

Кетопрофен ВР 2,5 % w/w;

Фармакотерапевтическая группа: НПВС для наружного применения.

Код АТХ: M02AA10.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика:

Кетопрофен - НПВС для наружного применения. Механизм действия связан с ингибированием синтеза простагландинов. Оказывает местное анальгезирующее, противовоспалительное, антиэкссудативное действие. При симптоматическом лечении заболеваний суставов, сухожилий, связок, мышц, кожи, при суставном синдроме уменьшает боли в суставах в покое и при движении, утреннюю скованность и отечность суставов.

Фармакокинетика:

При наружном применении всасывается чрезвычайно медленно и практически не кумулирует в организме.

Биодоступность геля - около 5 %. После наружного применения в дозе 50-150 мг концентрация в плазме через 5-8 ч – 0,08-0,15 мкг/мл.

Показания к применению

- заболевания опорно-двигательного аппарата (суставной синдром при ревматизме и обострении подагры, ревматоидный артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилоартрит, остеоартроз, остеохондроз с корешковым синдромом, радикулит, воспалительное поражение связок, сухожилий, бурсит, ишиас, люмбаго);
- мышечные боли ревматического и неревматического происхождения;
- посттравматическое воспаление мягких тканей и опорно-двигательного аппарата (повреждения и разрывы связок, ушибы).

Противопоказания

- повышенная чувствительность к кетопрофену, ацетилсалициловой кислоте и другим НПВС.
- дерматозы;
- экзема;
- инфицированные ссадины и раны;
- беременность и период лактации;
- детский возраст (до 12 лет);

Применение во время беременности и лактации:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Взрослым и детям с 12 лет наносят небольшое количество геля (3-5 см) 2-3 раза в день тонким слоем, с последующим длительным и осторожным втиранием на воспаленные или болезненные участки тела.

Продолжительность курса лечения не должна превышать 10 дней без консультации врача.

Можно использовать при фонофорезе.

Побочные эффекты:

Местные реакции, очень редко: аллергический дерматит, экзема, гиперемия кожи, фотодерматит, булезный дерматит, экзантема, пурпура.

При появлении каких-либо побочных эффектов необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Передозировка:

Крайне низкая системная абсорбция препарата Деятекс при наружном применении делает передозировку практически невозможной.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В настоящее время случаев лекарственного взаимодействия препарата Деятекс с другими лекарственными препаратами не выявлено.

Особые указания:

Не рекомендуется наносить гель на открытые раны или поврежденные участки кожи.

Нельзя допускать попадания геля на слизистые оболочки и в глаза.

Препарат нельзя применять с окклюзионными (воздухонепроницаемыми) повязками.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:

Нет данных о влиянии препарата на способность к вождению автотранспорта и управление механизмами.

Форма выпуска:

Гель для наружного применения 30 г в алюминиевой тубе. Одна туба вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C и в местах недоступных для детей.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.



Произведено для:
BELINDA Laboratories
Лондон, Великобритания
Производитель:
Ларк Лабораторис (И) Лтд.
Индия
belinda.tj