

# СЕДЕЛАЙТ

## ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного средства

**Торговое название:** Седалайт.

**Лекарственная форма:** таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

**Состав:** каждая таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит:

Валериана 50 мг;

Мята перечная 25 мг;

Мелисса лекарственная 25 мг.

**Фармакотерапевтическая группа:** седативное средство растительного происхождения.

**Код АТХ:** N05CM09.

**Фармакологическое действие:**

**Фармакодинамика:**

Седалайт является препаратом растительного происхождения с мягким седативным действием.

**Экстракт Валерианы** - уменьшает возбудимость центральной нервной системы, усиливает действие снотворных, обладает также спазмолитическими свойствами.

**Экстракт мелиссы** - оказывает мягкое успокаивающее действие, обладает умеренными спазмолитическими свойствами.

**Экстракт мяты перечной** - оказывает спазмолитическое, успокаивающее, желчегонное, противорвотное и местно раздражающее действие.

**Фармакокинетика:**

Действие препарата является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным.

**Показания к применению:**

Седалайт применяется как успокаивающее средство при:

- нервном возбуждении;
- бессоннице;
- неврозах, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- беспокойствах;
- нарушении сна.

**Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- артериальная гипотензия;
- детский возраст до 3 лет.

**Способ применения и дозы:**

*Взрослые и дети от 12 лет:* при нервозности 2 – 3 таблетки 2 – 3 раза в сутки.

*При бессоннице:* 2 – 3 таблетки за час до сна.

*Дети от 3 до 12 лет:* прием только под надзором врача. Дозу следует подбирать соответственно к массе тела (1 таблетка 1 – 3 раза в сутки).

Не следует применять препарат непрерывно более 1,5-2 месяцев.

При длительном применении таблеток привыкания не наблюдается.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

**Передозировка:**

Токсического действия препарата не отмечено. Одноразовый прием приблизительно 60 таблеток Седалайт может повлечь возникновение таких симптомов, как утомляемость, спазм в брюшной полости, беспокойство, головокружение, трепет рук и расширение зрачков. Эти симптомы исчезают в течение 24 часов.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не известна.

**Особые указания:**

Негативное действие препарата Седалайт при беременности и лактации не отмечено.

Как и в случае использования, препарат вообще особенной осторожности следует придерживаться в первом триместре беременности и в период грудного кормления, поэтому решение про применение препарата должен принять врач.

В рекомендованных дозах препарат не влияет на способность управлять автомобилем и механизмами.

**Форма выпуска:**

10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в каждом блистере. 4 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей.

**Срок годности:**

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска:**

Без рецепта.



Произведено для:  
**BELINDA Laboratories**  
Лондон, Великобритания  
Производитель:  
Сурья Хёрбал Лтд.,  
Индия