

ТРИВЕЙТ

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Тривейт.

Международное непатентованное наименование: Клотримазол + Беклометазон + Гентамицин.

Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Состав:

Клотримазол USP	10 мг;
Беклометазона дипропионат ВР	0,5 мг;
Гентамицина сульфат ВР экв. гентамицину	1 мг;
На мазевой основе	q.s.

Фармакотерапевтическая группа: Препарат с антибактериальным, противогрибковым и противовоспалительным действием для наружного применения.

Код АТХ: D07CC04.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Тривейт - противовоспалительное, противоаллергическое, антибактериальное, противогрибковое средство.

Клотримазол оказывает противогрибковое действие за счет нарушения синтеза эргостерина, являющегося составной частью клеточной мембраны грибов. Активен в отношении: *Trichophytonrubrum*, *Trichophytonmentagrophytes*, *Epidermophytonfloccosum*, *Microsporumcanis*, *Candida albicans*, *Malassezia furfur* (*Pityrosporumorbiculare*).

Беклометазон оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, антиэкссудативное и противозудное действие. Тормозит накопление лейкоцитов, высвобождение лизосомальных ферментов и медиаторов воспаления, угнетает фагоцитоз, уменьшает сосудисто-тканевую проницаемость, препятствует образованию воспалительного отека.

Гентамицин антибиотик широкого спектра действия из группы аминогликозидов, оказывает бактерицидное действие в отношении *грамотрицательных* бактерий - *Pseudomonasaeruginosa*, *Enterobacteraerogenes*, *Escherichiacoli*, *Proteusvulgaris*, *Klebsiellapneumoniae*; *грамположительных* бактерий: *Streptococcuspp.*, *Staphylococcus aureus*.

Фармакокинетика:

При нахождении на коже препарат в терапевтических дозах трансдермальное всасывание действующих веществ в кровь очень незначительное.

Показания к применению:

- дерматозы, осложненные вторичной инфекцией;
- эпидермофития стоп;
- дерматомикозы (в т.ч. с локализацией в паховой области), вызванные чувствительными к препарату возбудителями.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- туберкулез кожи;
- кожные проявления сифилиса;
- ветряная оспа;
- простой герпес;
- кожные реакции после вакцинации;
- детский возраст до 2 лет;
- беременность и период лактации;
- открытые раны.

Способ применения и дозы:

Наружно. Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2 раза в сутки (утром и вечером). Продолжительность лечения зависит от эффективности и переносимости терапии и составляет, как правило, 2-4 недели (не более).

Детям (от 2 до 16 лет) препарат назначают только строго по назначению и под контролем врача.

Побочное действие:

Дерматологические реакции: чувство жжения, гиперемия, эритема, шелушение, сухость, мацерация, атрофия кожи, стрии, гипертрихоз, фолликулит, потница, стероидные угри, периоральный дерматит, телеангиэктазия, гипопигментация, пиодермия, фурункулез.

Аллергические реакции: отек, крапивница, аллергический контактный дерматит.

Системные реакции (в т.ч. угнетение функции коры надпочечников) возможны при длительном применении.

Передозировка:

Симптомы: при превышении рекомендованных доз возможно развитие симптомов гиперкортинизма: увеличение массы тела, образование отеков, гипертезия, глюкозурия, гипокалиемия.

Лечение: симптоматическая терапия, при необходимости проводят коррекцию электролитного баланса. Рекомендуется постепенная отмена препарата.

Лекарственные взаимодействия:

Нет данных.

Особые указания:

Препарат не применяют в офтальмологии. Не наносить на кожу в области глаз. С целью повышения эффективности терапии возможно использование окклюзивных повязок. Необходимо учитывать, что при этом усиливается трансдермальное всасывание беклометазона и гентамицина, которое ведет к увеличению риска развития системных побочных эффектов. При проявлении устойчивой бактериальной или грибковой микрофлоры следует прекратить применение препарата и назначить соответствующую терапию. Возможно развитие перекрестной резистентности с аминогликозидными антибиотиками.

Форма выпуска:

Мазь для наружного применения 15 г в тубе, вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, не выше 25°C и в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

Указан на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.



Произведено для:
BELINDA Laboratories
Лондон, Великобритания
Производитель:
Скайпал Фармасьютикалс П. Лтд.
Индия

belinda.tj